


113 ESPÈCES
DE LA SAVANE-ROCHE ET
DES FORÊTS ALENTOURS

GUIDE NATURALISTE

DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DIRIGÉE
DE LA SAVANE-ROCHE
VIRGINIE

MAËL DEWYNTER
JULIEN NORWOOD
CAROLE POURCHER

JANVIER 2024




LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DIRIGÉE DE LA SAVANE-ROCHE VIRGINIE



La **Réserve Biologique Dirigée (RBD)** de la **Savane-roche Virginie** a été créée en 2022 et est gérée par l'Office national des forêts. Son objectif est la conservation des habitats et des espèces végétales et animales de la zone. Une réglementation est mise en place pour permettre la libre évolution du milieu.

La RBD se situe sur une zone à géologie granitique rare en Guyane. Ce substrat particulier a permis la formation d'un habitat forestier original qui regroupe des essences végétales spécialisées avec un niveau de naturalité élevé, et d'une savane-roche qui présente un intérêt paysager exceptionnel et des espèces typiques inféodées à cet habitat. Un sentier aménagé accessible au PK 122 de la RN2 vous permet de visiter ces milieux patrimoniaux et de passer la nuit en bivouac dans la zone dédiée (carbet bâche). Saurez-vous reconnaître les espèces de ce livret lors de votre visite ? Pour en savoir plus sur le sentier : onf.fr/savane-roche-Virginie



Réglementation applicable dans la réserve (Arrêté du 21 novembre 2022)



- La cueillette, la chasse, la pêche, la coupe de bois et toute forme de prélèvements (végétaux, roche et minéraux, champignons) sont interdits



- La circulation de véhicules, y compris vélo, chevaux et animaux de monte est interdite



- L'usage de drone est soumis à autorisation de l'ONF



- Tout marquage (peinture, rubalise, gravure sur roche, cairns) et abandon de déchets sont interdits. Restez sur les sentiers.



- L'apport de feu et bougies est interdit sur la savane-roche et en forêt. Les réchauds sont autorisés sur la zone de bivouac aménagée



- La pratique de l'escalade est interdite



- Le port d'armes de toute catégorie est interdit

OISEAUX

4



MAMMIFÈRES

16



AMPHIBIENS

21




REPTILES

25



FLORE

31



OISEAUX

ARA CHLOROPTÈRE

Ara chloroptera



Ailes vertes

MD

ARA ROUGE

Ara macao



Ailes jaunes

MD


Rouge

chloroptera

macao



Distinction difficile
en vol, à contre-jour



Bleu

Calotte noire

MAÏPOURI À TÊTE NOIRE

Pionites melanocephalus

Ventre blanc



MD


Queue
courte

Cercle
orbital
blanc

Bec pâle

Petit

Orange
pâle



MD

TOUI PARA

Brotheris chrysoptera



Grande tache
orange pâle

AMAZONE AOUROU

Amazona amazonica

Joue
jaune

Cercle
orbital
blanc

MD

Miroir orange



Bruyants en vol, souvent en formations rapprochées par deux (rarement par trois)

Queue
courte

AMAZONE POUDRÉE

Amazona farinosa

Nuque et
dos d'aspect
farineux

Miroir rouge



Queue bicolore, jaune et verte

AMAZONE DE DUFRESNE

Amazona dufresniana

Lore orange

Joue
bleue

MD

Miroir orange



Bec noir uni

TOUCAN ARIEL

Ramphastos vitellinus

Gorge
orangée

Rouge

MD

Carène
jaune

Bec bordeaux

Gorge
blanche

TOUCAN À BEC ROUGE

Ramphastos tucanus

Jaune

MD

Tête, nuque et
poitrine noires

TOUCANET KOULIK

Selenidera piperivora

Mâle

Nuque bordeaux
Poitrine grise

Femelle adulte

MD


OISEAUX

Contour de
l'œil bleu

TROGON À QUEUE BLANCHE

Trogon viridis

Mâle



MD

Femelle

Queue
blanche
rayée

Queue blanche

La distinction des femelles
des deux espèces est
pratiquement impossible

TROGON VIOLACÉ

Trogon violaceus

Contour de
l'œil jaune

Mâle



MD

Femelle
adulte

Queue
blanche
rayée

TROGON À QUEUE NOIRE

Trogon melanurus

Mâle

Contour de
l'œil rouge

Bec orange

Ventre rouge

MD

Queue noire



Femelle

Front gris

Contour de
l'œil rouge

Souvent posée au sol ou
dans le sous-bois

COLOMBE À FRONT GRIS


Leptotila rufaxilla



Deux espèces proches,
très communes, mais
difficiles à identifier sans
le chant.
Dans de bonnes
conditions d'observation,
la coloration de l'œil
permet toutefois
l'identification

PIGEON PLOMBÉ


Patagioenas plumbea



Évoluent plutôt
dans la canopée

PIGEON VINEUX

Patagioenas subvinacea



Mâle



Femelle

ENGULEVENT NOIRÂTRE

Nyctipolus nigrescens

Le plus souvent posé à
même la roche, très exposé.
Parfois perché dans la
végétation arbustive. Peu
farouche.



OISEAUX

TANGARA À BEC D'ARGENT

Ramphocelus carbo

Mandibule blanche

Femelle
et immature

Mâle
adulte

MD

TANGARA À GALONS ROUGES

Tachyphonus phoenicius

Tache rouge et
blanche à l'épaule
surtout visible en vol

Entièrement noir

Masque sombre
Gorge blanche

Mâle
adulte

Femelle
adulte

MD

Dominante
gris-bleu

TANGARA ÉVÈQUE

Thraupis episcopus

MD

Intimement lié à la
végétation de la savane-
roche où il est observé tant
au sol, sur la dalle, que dans
les arbustes

BRUANT CHINGOLO

Zonotrichia capensis

Immature

Adulte

JN

DACNIS BLEU

Dacnis cayana




Mâle adulte

Femelle adulte

GUI-TUIT SAÏ

Cyanerpes cyaneus



Mâle adulte


Menton bleu

Femelle adulte

Pattes rouges

GUI-TUIT CÉRULÉEN

Cyanerpes caeruleus



Mâle adulte

Menton noir

Femelle adulte

Pattes jaunes

Grand sourcil blanc

SUCRIER À VENTRE JAUNE

Coereba flaveola



Bec fin et courbé


Ventre jaune

OISEAUX

Le chant, caractéristique, est un crépitement puissant, lancé depuis le sous-bois

MANAKIN CASSE-NOISETTE

Manacus manacus



Mâle adulte


Femelle adulte et immature

Pattes orange

MD

TYRAN MÉLANCOLIQUE

Tyrannus melancholicus



Masque sombre

Poitrine olivâtre

Souvent posé à la cime des arbustes, sur la savane-roche. Décrit de larges cercles pour capturer ses proies puis revient se poser à son poste.

MD

PIAUAU HURLEUR

Lipaugus vociferans



MD

Stature générale d'un merle
Coloration terne
Le chant "pay-payo", extrêmement puissant, est lancé depuis le sous-bois.



Joue rouge

Mâle adulte



JN

Femelle adulte

PIC ONDÉ

Celeus undatus

Coloration rousse, entièrement grivelée de noir



Souvent en groupes bruyants



Longue queue jaune

CACIQUE VERT

Psarocolius viridis



JN




ORTALIDE MOTMOT

PARAKWA

Ortalis motmot

Souvent en groupes bruyants



JN



OISEAUX

Survolent la savane-roche,
souvent en groupe

MARTINET SPINICAUDE

Chaetura spinicaudus



Queue assez
courte




Croupion
blanc



MD



Sexes
identiques




Ventre noir

JN

JACAMAR À VENTRE BLANC


Galbula leucogastra



Collier
blanc

Ventre blanc

Mâle
adulte



Collier
Beige

Femelle
adulte

JN

Queue
très longue

CAMPYLOPTÈRE À VENTRE GRIS


Campylopterus largipennis



Gorge et
ventre gris



Grand colibri



Tache blanche
derrière l'œil

JN

COLIBRI JACOBIN

Florisuga mellivora



Mâle
adulte



Jeune
mâle


Femelle
adulte



JN

DRYADE À QUEUE FOURCHUE

Thalurania furcata



Mâle
adulte



Femelle
adulte



JN

SARCORAMPHE ROI

Sarcorampus papa

Envergure : 1,2 à 2 m

Bicolore,
noir & blanc



Adulte

MD



Immature

Envergure : 1,6 à 1,8 m

GRAND URUBU

Cathartes melambrotus

Zones claire
et sombre
juxtaposées



MD

CARACARA À GORGE ROUGE

Ibycter americanus

Envergure : 0,9 à 1,24 m

Poitrine noire
& ventre blanc



Immature



JN



Adulte

MAMMIFÈRES



TAMARIN À MAINS DORÉES

Saguinus midas

Très petit
Paraît tout noir
(bien que le dos soit brun-roux)
Pattes orange



SAKI À FACE PÂLE

Pithecia pithecia

Mâle : entièrement noir avec la face blanche
Femelle : livrée marron et ventre roux
Grande queue touffue



CAPUCIN BRUN

MACAQUE NOIR

Sapajus apella

Aspect sombre, dos brun
Épaules et avant-bras beiges

Favoris noirs encadrant le visage
et touffes noires sur le crâne

Queue noire souvent enroulée



HURLEUR DES GUYANES

BABOUNE

Alouatta macconnelli

Discret
Vit en groupes de 4 à 6

Pelage entièrement roux
Longue queue préhensile



ATÈLE NOIR

KWATA

Ateles paniscus

Bruyant et démonstratif
Vit en groupes de 15 à 20, souvent
subdivisés en petits groupes de 2 à 5

Pelage soyeux entièrement noir
Membres très allongés
Longue queue préhensile
Face rouge

MAMMIFÈRES

PIAN À OREILLES NOIRES

Didelphis marsupialis

Court manchon de poils sombres à la base de la queue

Base et extrémité des oreilles noire



QUATRE-YEUX GRIS

Philander opossum

Long manchon de poils à la base de la queue
Queue bicolore
Arboricole

Taches crème au-dessus des yeux



YAPOCK

Chironectes minimus

Aquatique
Bandes dorsales transversales noires sur fond gris
Pieds palmées



PÉCARI À LÈVRES BLANCHES

KOCHON BWA

Tayassu pecari

Grand "cochon" évoluant parfois en très grandes hardes

Lèvres inférieures blanches




PÉCARI À COLLIER PAKIRA

Pecari tajacu

Grand "cochon" vivant en groupes restreints

"Collier" clair caractéristique



MAMMIFÈRES

PUMA

Puma concolor




Grand félin (30 à 70 kg) élancé et puissant,
à l'allure de gros chien
Pelage beige à roux,
parfois moucheté chez les jeunes individus
Longue queue épaisse à pointe noire

JAGUAR

Panthera onca

Livrée mélanique plus rare



Grand félin massif et très puissant
Poids jusqu'à 120 kg
Livrée à base d'ocelles roux cerclés de noir sur fond fauve



Longue queue touffue

TAYRA

Eira barbara



Corps noir et tête beige clair
Gorge jaunâtre

Longue
queue
préhensile



KINKAJOU

Potos flavus

Arboricole et
nocturne

Les yeux reflètent la
lumière des lampes

Fourrure laineuse beige
ventre orangé

MAMMIFÈRES

AGOUTI


Dasyprocta leporina



Grand rongeur
Cul orange très caractéristique
Queue très courte

ACOUCHI

Myoprocta acouchy



Petit rongeur
(Poids de 500 g à 1,8 kg)
Cul brun
Queue blanche assez longue

PAC

Agouti paca



Grand rongeur nocturne
Pelage marron
tacheté de blanc

ÉCUREUIL DES GUYANES

Guerlinguetus aestuans



Grand écureuil (~ 200 g)
Démonstratif, queue souvent
positionnée au-dessus du corps
Face ventrale beige à orange

ÉCUREUIL NAIN

Sciurillus pusillus



Minuscule (~ 40 g) et discret
Touffe blanche derrière les oreilles
Queue maintenue droite, dans l'axe du corps
Souvent aplati, plaqué contre le support

MAMMIFÈRES

Poids : de 3 à 6 kg


Difficile à distinguer du Tatou de Kappler

Cuisse présentant des rangées d'écailles de petite taille

Queue à section arrondie dont les écailles sont lisses (pas de carènes)

TATOU DES GUYANES

Dasypus sp.



Poids : de 8 à 12 kg (massif)

Difficile à distinguer du Tatou des Guyanes


Queue large et aplatie à la base

Écailles de la base de la queue carénées

Joue blanchâtre

TATOU DE KAPPLER

Dasypus kappleri



Cuisse avec de longues écailles osseuses projetées

TAMANDUA

Tamandua tetradactyla

Forme mélanique assez rare

Longue queue préhensile

Poids : 3,5 à 8,4 kg

Pelage beige avec un "veston" plus sombre



AMPHIBIENS



Juvénile

CRAPAUD AGUA

CRAPAUD BUFFLE

Rhinella marina

Très commun sur les dalles de la savane-roche dès la tombée de la nuit


Le chant est un long roulement doux

Grand crapaud avec des glandes parotoïdes très développées et un museau caréné

Coloration beige uni (mâles) ou avec des macules noires ou rousses (juvéniles et femelles)
Iris doré



Mâle



CRAPAUD FEUILLE


Rhinella castaneotica

Espèce de la litière forestière

Crêtes indistinctes

Museau pointu

Iris verdâtre



PRISTIMANTE PORTE-X

Pristimantis chiastonotus

Espèce diurne et terrestre, strictement forestière

Grand X sombre, caractéristique, dessiné sur le dos

Partie latérale de la tête sombre ("masque")



PRISTIMANTE ZEUCTOTYLE

Pristimantis zeuctotylus

Espèce forestière crépusculaire

Mœurs plutôt troglodytes (souvent dans les cavités rocheuses et les grands troncs évidés)

Iris rouge cuivré



Juvénile : coloration à base de vert et de rouge

AMPHIBIENS

LEPTODACTYLE DE KNUDSEN

Leptodactylus knudseni

Grande espèce forestière, commune

Le chant est un *Wrrrououp...* grave et roulé, très puissant lancé pendant les averses

Un long bourrelet continu s'étend de l'œil jusqu'à la moitié du dos

Les flancs des adultes ont une teinte dominante orange à rouge



Juvénile

LEPTODACTYLE DE MYERS

Leptodactylus myersi

Grande espèce inféodée aux savanes-roche mais pouvant se retrouver dans la forêt périphérique

Bourrelets discontinus et grands tubercules sur le dos et les flancs conférant un aspect très granuleux
Cuisses teintées de rouge vif

Les juvéniles sont abondants localement sur la savane-roche en début de nuit. Les adultes sont plus discrets, souvent postés en bordure de végétation



Juvénile

LEPTODACTYLE ROUGEÂTRE

Leptodactylus rhodomystax

Espèce strictement forestière, assez commune, se reproduisant dans des flaques et des dépressions inondées

Le chant est un sifflement très puissant évoquant un sifflet d'arbitre

Teinte dominante brun rougeâtre
Un long bourrelet continu s'étend de l'œil à la base de l'aine
Lèvres marquées par une longue "moustache" effilée orange



Juvénile

ADÉNOMÈRE FAMILIÈRE

Adenomera andreae

Abondante

Chant typique, *puit... puit... puit* lent

Grande diversité de colorations et de motifs avec souvent une fine ligne orange dans le bas du dos
Présence régulière de bandes orange latérales



AMPHIBIENS

Très grande rainette, dotée d'une palmure
des mains très étendue
Motif dorsal très variable




RAINETTE PATTE D'OIE

Boana boans

Espèce forestière, fréquentant les
berges sableuses des rivières et se
reproduisant dans les flaques de
la savane-roche
Le chant est un croassement très
puissant *boa... boa...* et monotone

Au repos, l'œil se couvre d'une
membrane transparente délicatement
vermiculée d'or




OSTÉOCÉPHALE OOPHAGE

Osteocephalus oophagus

Rainette forestière, de taille
moyenne, à l'iris jaune rayonné
Museau granuleux retroussé

Coloration beige verdâtre maculé de sombre
Le chant, un ricanement nerveux, est lancé
depuis de petits réservoirs d'eau (cavité dans
un tronc, broméliacée)



Iris jaune rayonné




SCINAX DE BOESEMANN

Scinax boesemani

Chante depuis les mares
temporaires de la savane-roche
ou depuis les rosaces des grandes
Broméliacées. Le chant est un
grincement bref et aigu

Livrée souvent mouchetée
Un trait sombre traverse l'œil
depuis la narine jusqu'au-delà
du tympan

AMPHIBIENS



DENDROBATE À TAPIRER

Dendrobates tinctorius


Espèce forestière stricte, souvent présente à proximité des grands chablis

DENDROBATE À VENTRE TACHETÉ

Ranitomeya variabilis

Petite espèce forestière discrète mais facilement détectable dans les massifs de Broméliacées de la savane-roche

Le chant est un bourdonnement ténu, évoquant un grillon



ALLOBATE FÉMORAL

Allobates femoralis

Petite espèce commune de la litière forestière

Le chant typique, ... *cimi cimi*... *cimi cimi*... est omniprésent en forêt

Flancs noirs séparés du dos brun par une ligne claire

Ventre noir tacheté de blanc
Lèvres blanches



GRENOUILLE-TAUPE ZOMBIE

Synapturanus zombie

Espèce forestière, dont les mœurs fouisseuses - l'espèce se déplace dans des galeries souterraines - rendent l'observation anecdotique

Le chant est en revanche typique : un sifflement doux *piou... piou... piou*, régulier, évoquant le cri d'un poussin, entendu lors des premières pluies

Corps dodu, de coloration orangée
Museau busqué et yeux très petits



REPTILES

KENTROPYX DES CHABLIS

Kentropyx calcarata



Adulte

Lézard terrestre, très agile dans la végétation également, fréquentant les chablis pour s'exposer au soleil
Adulte : dégradé du vert au roux sur le dos ; tête marron et œil rouge



Juvénile

Juvénile : trois lignes vertes "fluo" s'étendant sur la tête et l'avant du corps



AMEIVE COMMUN

Ameiva ameiva



Mâle adulte

Grand lézard terrestre forestier recherchant les places ensoleillées : chablis, dalle de la savane-roche

Mâle adulte : corps vert, queue bleue, tête beige vermiculée



Juvénile

Femelle et juvénile : corps brun, tête verte, ligne dorsolatérale sombre



TÉJU COMMUN

Tupinambis teguixin



Grand lézard terrestre, rappelant un varan. Se déplace lentement, dans les zones de chablis, en quête de nourriture. Très craintif et prompt à fuir

Longue queue annelée



Juvénile

REPTILES



REPTILES

GECKO NAIN D'AMAZONIE

Chatogekko amazonicus

Lézard minuscule de la litière ombragée qui se déplace nerveusement dans le tapis de feuilles mortes, tantôt en surface, tantôt dissimulé

Queue courte et épaisse

Fine bande blanche sur les cuisses et la base de la queue

Longueur totale maximale : 44 mm

GONATODE AUX YEUX BLEUS

Gonatodes annularis

Petit gecko forestier d'aspect trapu, recherchant les cavités des grands arbres dressés ou couchés
Souvent dissimulés à la base des troncs, dans les contreforts

Mâle : jolie coloration sombre ponctuée de jaune et yeux bleus

Femelle : livrée plus cryptique
Se reconnaît aisément à l'extrémité de sa queue annelée de noir et de blanc

Longueur totale maximale : 104 mm

LÉPOSOME DES GUYANES

Loxopholis guianense

Petit lézard diurne de la litière ombragée qui se déplace rapidement dans le tapis de feuilles mortes et disparaît très vite

Queue longue et fine
Aspect sombre, avec deux bandes plus claires dorsolatérales

Mâle : ventre, joues et flancs, de coloration brique à rouge
Femelle : plus terne avec un ventre beige

Œil rouge

REPTILES

MABUYA À POINTS NOIRS

Copeoglossum nigropunctatum



Commun

Posté aux heures chaudes dans les chablis

Aspect trapu, "boudiné" et brillant


Le corps, cylindrique, est prolongé d'une queue épaisse



TROPIDURE PLISSÉ

Plica plica

Grand lézard arboricole posté verticalement sur les
grands troncs ou sur les chaos rocheux



GRAGE PETITS CARREAUX

Bothrops atrox



Sûrement l'espèce de serpent la plus
observée en Guyane

Discret, souvent lové le long des sentiers ou

figé, tout en longueur, en travers d'un layon

Peu agressif, mais sa morsure est dangereuse

et nécessite une hospitalisation

Se reconnaît à sa livrée constituée de
"carreaux", très cryptique dans la litière,
et à cette grande marque noire allongée
en arrière de l'œil

Les juvéniles ont l'extrémité de la queue
jaune



REPTILES




BOA BRODÉ / BOA D'AMAZONIE

Corallus hortulanus

L'un des serpents les plus observés en Guyane
Arboricole et nocturne
Les rétines réfléchissent la lumière des lampes frontales



La livrée est très variable. Les adultes sont majoritairement gris ou beiges avec des macules sombres. Les juvéniles présentent parfois des colorations sublimes à base de orange ou de rouge



Plutôt agressif, mais sa morsure n'est pas dangereuse



IMANTODE À NUQUE TATOUÉE

Imantodes cenchoa


Couleuvre nocturne, très longue et fine, avec une tête globuleuse et de grands yeux disproportionnés

Coloration beige avec des taches brunes
Deux longues taches sombres allongées sur la nuque



OXYRHOPE À COL JAUNE


Oxyrhopus melanogenys



Couleuvre nocturne, terrestre, inoffensive
Coloration noire avec une alternance d'anneaux blancs étroits et jaunes
Arrière de la tête jaune à orange

Corail à collier

Attention : confusion possible avec le Corail à collier d'or (*Micrurus hemprichii*), dont la morsure est venimeuse.



REPTILES

TORTUE DENTICULÉE

Chelonoidis denticulatus



Grande tortue terrestre
croisée régulièrement sur
les sentiers forestiers

Écailles orange sur les pattes
et sur le dessus de la tête

Taille du nouveau-né : de 4,6 à 5,2 cm


Taille adulte : de 23 à 82 cm



Juvénile

PLATÉMYDE À TÊTE ORANGE

Platemys platycephala



Tortue aquatique souvent
observée dans des mares
temporaires forestières
Parfois visible de nuit dans
les flaques de la savane-roche

Dessus de la tête
entièrement orange



Présence d'une "gouttière" vertébrale
sur la dossière

Présence de 2 barbillons sous le menton

Taille du nouveau-né : de 4,3 à 5,7 cm

Taille adulte : de 13 à 18 cm



RHINOCCLEMMYDE PONCTUÉE


Rhinoclemmys punctularia

Tortue aquatique qui peut s'observer dans les
flaques et criquots de la savane-roche

Motifs de la tête et du cou
en forme de points, virgules,
boucles et courbes de couleurs rouges et
jaunes



Juvénile



Taille du nouveau-né : 5,9 cm

Taille adulte : de 10,5 à 26 cm

GLOSSAIRE

Caducifolié : qui perd ses feuilles de manière saisonnière.

Épiphyte : qui se sert d'une autre plante comme support. Ce n'est pas un parasite (qui vit au détriment de son hôte). Ce mode de croissance sert souvent à pousser plus haut et ainsi bénéficier de plus de lumière.

Hémi-épiphyte grimpant : plante qui germe au sol puis effectue sa croissance sur un support.

Inflorescence : ensemble de fleurs groupées sur un axe.


Pseudobulbe : organe de réserve d'eau et d'éléments nutritifs de certaines espèces d'orchidées.

Saxicole : qui pousse sur de la roche.

ARACEAE

ANTHURIUM JENMANII

Herbacée



Inflorescence contenant plus de 3000 minuscules fleurs !

Pousse aussi bien dans la canopée que sur les rochers



Grandes feuilles dressées abritant des nids de fourmis

PHILODENDRON BILLIETIAE

Hémi-épiphyte grimpant

Pétiole jaune(-vert) ou orange
Feuille 2,5 fois plus longue que large



Inflorescence protégée dans une spathe



BIGNONIACEAE

HANDROANTHUS CAPITATUS

Arbre ou arbuste (caducifolié)



Floraison jaune remarquable,
fleurs butinées par les abeilles
Mélipones

BROMELIACEAE

AECHMEA MELINONII

Herbacée épiphyte ou saxicole



Feuilles en rosettes
pouvant héberger de
petits êtres vivants
(algues, grenouilles,...)

TILLANDSIA FLEXUOSA

Épiphyte




Rosette torsadée en
tube plus ou moins
étroit

CLUSIACEAE

CLUSIA BLATTOPHILA

Arbre ou arbuste



Flleurs pollinisées par des blattes
Fruits sphériques s'ouvrant en étoile de 4 à 6 branches

COMBRETACEAE

TERMINALIA AMAZONIA

Arbre ou arbuste (caducifolié)



Inflorescences

Fruits ailés
mangés
par les
perroquets

Feuilles groupées à l'extrémité des branches

COSTACEAE

COSTUS SCABER

Herbacée




Lisière savane-roche/forêt

Inflorescences dressées
rouge-orange, fleurs colorées,
en tube, au nectar abondant,
visitées par les colibris

CYCLANTHACEAE

LUDOVIA LANCIFOLIA

Herbacée terrestre, saxicole ou épiphyte



Floraison et fructification au niveau de l'insertion des feuilles



Longues feuilles dressées en forme d'épée, pouvant atteindre un mètre de hauteur

Petite herbe d'environ 30 à 50 cm



CYPERACEAE

RHYNCHOSPORA SUBDICEPHALA

Herbacée

Inflorescence globuleuse

Affectionne les mares gravillonnaires et les fissures de la roche



Poils blancs tout au long de la tige



ERICACEAE


SATYRIA CERANDER

Liane

Plante à feuilles coriaces



Fleurs rouges ou roses



FABACEAE

DIOCLEA GUIANENSIS

Liane

Fleurs mauves, fruits sous forme de gousses plates à plusieurs graines. Affectionne les savanes-roche
Plante-hôte de nombreux papillons

CHAMAECRISTA DESVAUXII



VAR. *SAXATILIS*

Herbacée

Plante plus ou moins rampante à tiges rouges et vertes

Graines expulsées lors de l'ouverture de la gousse

Gousse




CHELONANTHUS PURPURASCENS

Herbacée

Fréquente en lisière forestière et autour des bosquets de la savane-roche

Fleurs pourpres ou bleutées




LAMIACEAE

COLEUS MONOSTACHYUS

Herbacée

ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE, d'origine africaine, découverte sur le sommet de la savane-roche vers 2012
Sans doute arrivée sous une semelle de chaussure de randonnée...




MARCGRAVIACEAE

NORANTEA GUIANENSIS

Liane

Fruits contenant des graines entourées d'une pulpe rouge charnue



Inflorescence

Longues inflorescences (~80 cm) formées de petites fleurs associées à d'impressionnantes poches rouge-orangé contenant un nectar très apprécié des oiseaux

MELASTOMATACEAE

ERNESTIA CONFERTIFLORA

Sous-arbrisseau saxicole

Petite plante inféodée aux savanes-roche, formant souvent des touffes isolées

Fleurs à 4 pétales mauves



MYRTACEAE

MYRCIA SAXATILIS

Arbre ou arbuste

Présent essentiellement sur les savanes-roche

Petites feuilles coriaces légèrement enroulées vers l'intérieur

CYRTOPODIUM ANDERSONII

Herbacée saxicole

ESPÈCE PROTÉGÉE



Fleurs jaune vif

Fruit en capsule contenant de minuscules graines



Affectionne les savanes-roche où elle pousse soit isolément, soit en marge des bosquets

Pseudobulbe élancé, feuilles en éventail



ENCYCLIA GRANITICA

Herbacée épiphyte ou saxicole

Pseudobulbe arrondi portant 1 ou 2 feuilles

Fleurs agréablement parfumées

